

レジメン名： Pertuzumab+HER+DTX

番号	抗がん剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日 (day1、day8等)
1	パージェタ	840mg/body	点滴静注	60分	初回 day1
2	パージェタ	420mg/body	点滴静注	(*1)	2回目以降 day1
3	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	90分	初回 day1
4	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	(*1)	2回目以降 day1
5	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	day1
6					
7					

プレメディケーション (制吐対策など)	デキサート注6.6mg
催吐リスク	軽度
皮膚組織障害分類	パージェタ、トラスツズマブ：非壊死性 ドセタキセル：壊死性
投与間隔	21日
総コース数	
<p>備考</p> <p>(*1)</p> <p>初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。</p> <p>パージェタ：前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量の840mgで投与を行う。</p> <p>トラスツズマブ：投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与することが望ましい。</p>	

更新日：2021/3/1