

レジメン名： PTX+HER weekly（術前術後）

| 番号 | 抗がん剤 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日（day1、day8等） |
|----|---------|---------------------|------|------|-------------------|
| 1 | トラスツズマブ | 4mg/kg | 点滴静注 | 90分 | 初回 day1 |
| 2 | トラスツズマブ | 2mg/kg | 点滴静注 | (*1) | 2回目以降 day1 |
| 3 | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴静注 | 60分 | day1 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| プレメディケーション (制吐対策など) | デキサート注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg |
| 催吐リスク | 軽度 |
| 皮膚組織障害分類 | トラスツズマブ：非壊死性、パクリタキセル：壊死性 |
| 投与間隔 | 7日 |
| 総コース数 | 12コース |

備考

(*1)

初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

トラスツズマブ：投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量で投与することが望ましい。