

## レジメン名： Atezolizumab+Bmab+CBDCA+PTX

番号	抗がん剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日 (day1、day8等)
1	テセントリク	1200mg/body	点滴静注	(*1)	day1
2	アバスチン	15mg/kg	点滴静注	(*2)	day1
3	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	day1
4	カルボプラチン	AUC 6(*3)	点滴静注	60分	day1
5					
6					
7					

プレメディケーション (制吐対策など)	グラニセトロン3mg+デキサート注16.5mg+ポララミン注5mg +ファモチジン注20mg
催吐リスク	中等度
皮膚組織障害分類	パクリタキセル：壊死性、カルボプラチン：炎症性 アバスチン：非壊死性、テセントリク：情報なし
投与間隔	21日
総コース数	4または6コース

### 備考

(\*1)

初回投与時は60分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

(\*2)

初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。

(\*3)

Calvert の式：投与量 = AUC目標値 × [GFR (糸球体濾過量) + 25] (mg)