

## レジメン名： GEM+S-1

| 番号 | 抗がん剤   | 1日投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 (day1、day8等) |
|----|--------|-----------------------|------|------|------------------|
| 1  | ゲムシタビン | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分  | day1、day8        |
| 2  | S-1    | (*1)                  | 内服   | 分2   | day1 夕~day15 朝   |
| 3  |        |                       |      |      |                  |
| 4  |        |                       |      |      |                  |
| 5  |        |                       |      |      |                  |
| 6  |        |                       |      |      |                  |
| 7  |        |                       |      |      |                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| プレメディケーション<br>(制吐対策など)  | パロノセトロン0.75mg+デキサート注6.6mg |
| 催吐リスク   | 中等度(*2)                   |
| 皮膚組織障害分類  | ゲムシタビン：炎症性                |
| 投与間隔  | 21日                       |
| 総コース数   |                           |
| 備考  |                           |
| (*1)<br>60mg/m <sup>2</sup> 。投与量は添付文書参照。  |                           |
| (*2)<br>原則通りであれば軽度リスクであるが、他の薬剤を併用した試験ではGEM単剤より<br>催吐性リスクが高いと報告されているため。<br>(制吐薬適正使用ガイドライン 2015年10月【第2版】より) |                           |

更新日：2021/8/13