

レジメン名： FOLFOXIRI+Bevacizumab (JACCRO)

番号	抗がん剤	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日 (day1、day8等)
1	アバスチン(*1)	5mg/kg	点滴静注	(*2)	day1
2	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	90分 ^(*3)	day1
3	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	120分 ^(*3)	day1
4	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	120分	day1
5	5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間 ^(*4)	day1～
6					
7					

プレメディケーション (制吐対策など)	パロノセトロン0.75mg+デキサート注9.9mg アプレピタントカプセル、デカドロン錠
催吐リスク	高度
皮膚組織障害分類	アバスチン：非壊死性 イリノテカン、オキサリプラチン、5-FU：炎症性
投与間隔	14日
総コース数	
備考	
<p>(*1) 定期的に尿蛋白をモニタリングすること。</p> <p>(*2) 初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。</p> <p>(*3) レボホリナートとイリノテカンは同時に投与開始。</p> <p>(*4) シユアーフューザー使用。±6時間程度の誤差の可能性あり。</p>	