

レジメン名： PEM+Bevacizumab

| 番号 | 抗がん剤 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 (day1、day8等) |
|----|-------------|----------------------|------|------|------------------|
| 1 | アバスチン | 15mg/kg | 点滴静注 | (*1) | day1 |
| 2 | ペメトレキセド(*2) | 500mg/m ² | 点滴静注 | 10分 | day1 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| プレメディケーション (制吐対策など) | デキサート注6.6mg |
| 催吐リスク | 軽度 |
| 皮膚組織障害分類 | アバスチン、ペメトレキセド：非壊死性 |
| 投与間隔 | 21日 |
| 総コース数 | |
| 備考 | |
| (*1) 初回投与時は90分かけて点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。 | |
| (*2) 本剤による重篤な副作用の発現を軽減するため、以下のように葉酸及びビタミンB12を投与すること。(詳細は添付文書参照) | |

更新日：2022/3/23